

הוספת תבנית לתשובת הניבחן. ת בשאלה פתוחה מסוג מאמר

1. יש להוסיף שאלה פתוחה מסוג מאמר:

בחרת סוג שאלה להוספה

יש לבחור סוג שאלה לתצוגת התיאור שלה.

התאמה

התאמה, מבוססת שאלות "תשובה קצרה" אקראיות

חישוב

חישוב (פשוטה)

מאמר (שאלה פתוחה ארוכה)

מיקום

נקודות-ציון על תמונה

מספרי

נכון/לא-נכון

2. לאחר הוספת תוכן השאלה יש לגלול ל "תבנית תגובה":


The image shows the top toolbar of the Tebniit editor. It contains various icons for text editing and formatting, such as bold (B), italic (I), underline (U), and text color. There are also icons for alignment (left, center, right), indentation, and list creation. The interface is in Hebrew, with the title 'תבנית תגובה' (Response Template) and a subtitle 'תבנית מענה' (Answer Template).

3. להכניס את התבנית הרלוונטית. למשל:

			שני רכיבי התזוזה
			שני רכיבי התזוזה
			שני רכיבי התזוזה
			k1
			k2
			k3

4. מנקודת מבט הנבחן.ת:

בעת הצגת השאלה התבנית תופיע במקום בו נדרשת הקלדת התשובה:



[10] הקלידו את רכיבי $\mathbf{u}$ לכל נקודה בטופס הבחינה.

ב. נתון שעדה התזווחות בטופף הוא מהצורה:

$$u_x = k_1x + k_2x^2 + k_3xy$$

$$u_y = k_4 y (1 + 0.25x^2)$$

[10] חשבו את ערכי הקבוצים k_1, k_2, k_3, k_{k-1} הקלידו את ערכי הקבוצים בטופס הבחינה.

ג. חשבו את סגור המעוותים המישוריים $e(x, y)$. הקלידו את רכיבי המעוות ב- A כמאפס

הבחנות. [5]

ד. חשבו את המעוות המתפתח במרכז המלון לאורך האלכסון BC . הקלידו התשובה בטופס

הפתיחה. [5]

ה. חשבו את השינוי בנזיקת של הפינה B עקב הדפורמציה. הקלידו התשובה בתימוס הבחינה. [5]

x^2
 x_2
 $\frac{\square}{\square}$
 $\underline{\square}$

			שני רכיבי התזוזה A
			שני רכיבי התזוזה B
			שני רכיבי התזוזה C
			k1
			k2
			k3